

Instruções de utilização

Por favor leia estas informações cuidadosamente, pois irá ajudá-lo a utilizar HYLO DUAL® da forma correta.

HYLO DUAL®

Hialuronato de sódio e ectoína

Hidrata os olhos secos, estabiliza a película lacrimal e reduz os sintomas inflamatórios e alérgicos tais como prurido e ardor.

Colírio estéril, sem fosfatos e sem conservantes.

O que é HYLO DUAL®?

HYLO DUAL® é uma solução estéril sem conservantes para uso ocular.

Composição:

1 ml de HYLO DUAL® contém 0,5 mg de hialuronato de sódio, 20 mg de ectoína, ácido bórico, bórax e água para preparações injetáveis.

Para que é utilizado HYLO DUAL®?

HYLO DUAL® hidrata a córnea e a conjuntiva e protege contra a evaporação excessiva das lágrimas. Esta estabilização das lágrimas alivia os sintomas inflamatórios dos olhos irritados, bem como em caso de alergias. A sensação de irritação e ardor nos olhos desaparece.

Quando deve HYLO DUAL® ser utilizado?

As sensações de ardor, comichão, lacrimejamento, de presença de corpo estranho ou a sensação de olhos secos são sintomas de olhos irritados. Este é frequentemente um sintoma de que o olho não está devidamente humedecido. Outra causa são as hipersensibilidades contra determinadas substâncias (p. ex. pólen, pêlo de animais ou pó doméstico), as chamadas alergias. Uma vez que as alergias evidenciam sintomas semelhantes, é difícil diferenciar entre um olho seco ou um olho alérgico.

HYLO DUAL® é vantajoso nestes casos devido ao duplo modo de ação do hialuronato de sódio e da ectoína.

HYLO DUAL® contém hialuronato de sódio, uma substância fisiológica que está presente no olho mas também noutros tecidos no corpo. O hialuronato de sódio tem a propriedade especial de formar uma camada de humidade homogénea, estável e particularmente duradoura na superfície do olho, sem que esta seja eliminada muito rapidamente.


A ectoína é uma substância natural obtida a partir de microrganismos que vivem em ambientes extremos (p. ex. lagos salgados). Para se protegerem contra estas condições ambientais extremas, esses microrganismos formam a substância natural ectoína. As suas propriedades específicas são utilizadas no HYLO DUAL®. A ectoína aumenta a captura de água pelas células da superfície ocular. Isto forma uma barreira fisiológica na conjuntiva, contra as substâncias que atuam como alergénios.

Ao mesmo tempo, a ectoína estabiliza a camada lipídica da película lacrimal que protege contra a evaporação excessiva das lágrimas.

A interação do hialuronato de sódio e da ectoína assegura uma lubrificação intensiva e duradoura da superfície ocular e protege contra a evaporação das lágrimas. Os sintomas típicos de comichão e ardor que ocorrem como reações inflamatórias a irritações causadas pelo ambiente, bem como a reações alérgicas são aliviados por HYLO DUAL®.


Como se utiliza HYLO DUAL®?

Utilize HYLO DUAL® apenas se o selo da embalagem de cartão dobrável estiver intacto antes da primeira utilização (☺).




Etapa 1:

Remover a tampa antes de utilizar. Para isto, manter a tampa levemente sobre o frasco e retirar com a outra mão o frasco da tampa com um movimento rotatório. Antes da primeira aplicação, por favor faça girar o frasco de HYLO DUAL® com a sua extremidade para baixo e pressione o fundo do frasco até que a primeira gota apareça no adaptador. O frasco está agora pronto a ser utilizado.




Etapa 2:

Segure o frasco invertido com o polegar na curvatura do frasco e os restantes dedos no fundo do mesmo.




Etapa 3:

Apoie a mão a segurar o frasco COMOD®, tal como demonstrado para a outra mão.



Etapa 4:

Incline ligeiramente a sua cabeça para trás, afaste ligeiramente a sua pálpebra inferior e aplique uma pressão forte e breve na parte central do fundo do frasco. Isto ativa o mecanismo para a libertação de uma gota. Devido ao sistema de válvulas especial COMOD®, o tamanho e a velocidade de cada gota são idênticos independentemente de quanta pressão seja aplicada. Feche lentamente os seus olhos para permitir que o fluido se espalhe de forma igual pela superfície do olho.



Etapa 5:

Volte a colocar a tampa imediatamente após a utilização. Assegure-se que a ponta do aplicador está seca. Quando aplicar o fluido, por favor evite qualquer contacto entre a extremidade do frasco e o seu olho ou pele.

Cada frasco liberta aproximadamente 10 ml de solução, o que equivale a aproximadamente 300 gotas. Por motivos técnicos, permanece sempre um pequeno volume residual de líquido no frasco no final da sua utilização.

HYLO DUAL® pode ser utilizado por um prazo ilimitado. Apenas deve ser tratada uma pessoa com cada frasco de HYLO DUAL®.

O que mais precisa de saber?

Caso utilize quaisquer outros colírios, deverá existir um intervalo de pelo menos 30 minutos entre as aplicações, e HYLO DUAL® deverá sempre ser utilizado em último lugar. No entanto, as pomadas oftálmicas deverão sempre ser administradas após utilizar HYLO DUAL®.

Uma vez que não contém conservantes, HYLO DUAL® é bem-tolerado mesmo quando utilizado ao longo de um período de tempo alargado. Foram relatados casos muito raros de reações de hipersensibilidade, tais como ardor ou lacrimejamento excessivo, que pararam imediatamente quando a utilização de HYLO DUAL® foi interrompida.

HYLO DUAL® pode ser utilizado quando usar lentes de contacto. Para evitar as reações de incompatibilidade que são possíveis devido a interações entre os produtos para lentes de contacto e HYLO DUAL®, recomendamos que aguarde cerca de 30 minutos após a inserção de lentes de contacto para aplicar o colírio.

Não existem quaisquer notificações acerca da utilização de HYLO DUAL® durante a gravidez e lactação. Por favor fale com o seu médico ou farmacêutico antes de utilizar HYLO DUAL® caso esteja grávida, possa estar grávida ou esteja a amamentar.


Com que frequência e durante quanto tempo pode utilizar HYLO DUAL®?

HYLO DUAL® deve ser utilizado de acordo com as instruções dadas pelo seu médico. De uma forma geral, os adultos e as crianças com 6 anos, ou mais, instilam uma gota de HYLO DUAL® na bolsa conjuntival de cada olho, três vezes ao dia. Caso aplique HYLO DUAL® com maior frequência (p. ex. mais de 10 vezes ao dia) ou sofra de sintomas mais graves, deverá consultar regularmente um oftalmologista. HYLO DUAL® é considerado adequado para tratamento a longo termo. Contudo, tal como com todos os sintomas persistentes, deverá contactar o seu oftalmologista caso os seus sintomas não melhorem, p. ex., no prazo de duas semanas.

Quando não deve utilizar HYLO DUAL®?

HYLO DUAL® não deve ser utilizado se tiver hipersensibilidade a qualquer um dos componentes e também em crianças com menos de 6 anos de idade.

O que precisa de saber acerca de conservar HYLO DUAL®?

Não conservar acima de 25 °C ( 25 °C).

HYLO DUAL® pode ser utilizado durante 6 meses após a abertura.

Não usar após a data de validade ().

Manter fora do alcance das crianças.

Estão disponíveis as seguintes apresentações:

10 ml de colírio

Data das informações:



Outubro 2018

Fabricante ():

URSAPHARM Arzneimittel GmbH
Industriestraße 35
66129 Saarbrücken
Alemanha

Distribuidor:

URSAPHARM, UNIPESSOAL LDA.
Avenida D. João II, N.º 20, 1º Andar,
Parque das Nações
1990-095 Lisboa, Portugal
E-Mail: info@ursapharm.pt

 0197  STERILE A
Dispositivo médico