

Instruções de utilização

Por favor leia estas informações cuidadosamente, pois irá ajudá-lo a utilizar HYLO DUAL INTENSE® da forma correta.

HYLO DUAL INTENSE®

Hialuronato de sódio e ectoína

Para lubrificação intensiva e terapêutica de olhos secos e estabilização do filme lacrimal. Alivia os sintomas inflamatórios tais como prurido (comichão) e sensação de ardor.

Colírio estéril, sem fosfatos e sem conservantes.

O que é HYLO DUAL INTENSE®?

HYLO DUAL INTENSE® é uma solução estéril sem conservantes para uso ocular.

Composição:

1 ml de HYLO DUAL INTENSE® contém 2 mg de hialuronato de sódio, 20 mg de ectoína, ácido bórico, bórx e água para preparações injetáveis.

Para que é utilizado HYLO DUAL INTENSE®?

HYLO DUAL INTENSE® é utilizado na lubrificação intensiva e terapêutica do olho seco e estabilização do filme lacrimal. No alívio dos sintomas inflamatórios tais como prurido (comichão) e sensação de ardor.

Quando deve HYLO DUAL INTENSE® ser utilizado?

As sensações de ardor, comichão, lacrimejamento, de presença de corpo estranho ou a sensação de olhos secos são sintomas de olhos irritados. Este é frequentemente um sintoma de que o olho não está devidamente humedecido. HYLO DUAL INTENSE® é vantajoso nestes casos devido ao duplo modo de ação do hialuronato de sódio e da ectoína.

HYLO DUAL INTENSE® contém sal sódico do ácido hialurônico, uma substância fisiológica que está presente no olho mas também noutros tecidos no corpo. O hialuronato de sódio tem a propriedade física especial de formar uma película hidratante e lubrificante homogênea, estável e particularmente duradoura na superfície do olho, sem que esta seja eliminada muito rapidamente. Esta propriedade denominada de bioadesiva garante que a córnea e a conjuntiva estão protegidas e juntamente com as lágrimas fisiológicas, a pálpebra desliza sobre a superfície do olho. O HYLO DUAL INTENSE® contém uma quantidade maior de hialuronato de sódio, o que o torna mais viscoso e, ao fazê-lo, forma uma película hidratante intensiva, calmante e duradoura. Sintomas persistentes ou mais graves são aliviados e o olho é protegido contra outras irritações.


A ectoína é uma substância natural obtida a partir de microrganismos que vivem em ambientes extremos (p. ex. lagos salgados). Para se protegerem contra estas condições ambientais extremas, esses microrganismos formam a substância natural ectoína. As suas propriedades específicas são utilizadas no HYLO DUAL INTENSE®. A ectoína aumenta a captura de água pelas células da superfície ocular. Isto forma

uma barreira fisiológica na conjuntiva. Ao mesmo tempo, a ectoína estabiliza a camada lipídica da película lacrimal que protege contra a evaporação excessiva das lágrimas.

A interação do hialuronato de sódio e da ectoína assegura uma lubrificação intensiva e duradoura da superfície ocular e protege contra a evaporação das lágrimas. Os sintomas típicos de comichão e ardor que ocorrem como reações inflamatórias a irritações causadas pelo ambiente são aliviados por HYLO DUAL INTENSE®.


Como se utiliza HYLO DUAL INTENSE®?

Utilize HYLO DUAL INTENSE® apenas se o selo da embalagem de cartão dobrável estiver intacto antes da primeira utilização (☞).




Etapa 1

Remover a tampa antes de utilizar. Para isto, manter a tampa levemente sobre o frasco e retirar com a outra mão o frasco da tampa com um movimento rotatório. Antes da primeira aplicação, por favor faça girar o frasco de HYLO DUAL INTENSE® com a sua extremidade para baixo e pressione o fundo do frasco até que a primeira gota apareça no adaptador. O frasco está agora pronto a ser utilizado.



Etapa 2

Segure o frasco invertido com o polegar na curvatura do frasco e os restantes dedos no fundo do mesmo.




Etapa 3

Apoie a mão a segurar o frasco COMOD®, tal como demonstrado para a outra mão.



Etapa 4

Incline ligeiramente a sua cabeça para trás, afaste ligeiramente a sua pálpebra inferior e aplique uma pressão forte e breve na parte central do fundo do frasco. Isto ativa o mecanismo para a libertação de uma gota. Devido ao sistema de válvulas especial COMOD®, o tamanho e a velocidade de cada gota são idênticos independentemente de quanta pressão seja aplicada. Feche lentamente os seus olhos para permitir que o fluido se espalhe de forma igual pela superfície do olho.



Etapa 5

Volte a colocar a tampa imediatamente após a utilização. Assegure-se que a ponta do aplicador está seca. Quando aplicar o fluido, por favor evite qualquer contato entre a extremidade do frasco e o seu olho ou pele.

Cada frasco liberta aproximadamente 10 ml de solução, o que equivale a aproximadamente 300 gotas. Por motivos técnicos, permanece sempre um pequeno volume residual de líquido no frasco no final da sua utilização.

HYLO DUAL INTENSE® pode ser utilizado por um prazo ilimitado.

Apenas deve ser tratada uma pessoa com cada frasco de HYLO DUAL INTENSE®.

O que mais precisa de saber?

Caso utilize quaisquer outros colírios, deverá existir um intervalo de pelo menos 30 minutos entre as aplicações, e HYLO DUAL INTENSE® deverá sempre ser utilizado em último lugar. As pomadas oftálmicas não devem ser aplicadas durante o tratamento com HYLO DUAL INTENSE®.

Uma vez que não contém conservantes, HYLO DUAL INTENSE® é bem-tolerado mesmo quando utilizado ao longo de um período de tempo alargado. Foram relatados casos muito raros de reações de hipersensibilidade, tais como ardor ou lacrimejamento excessivo, que pararam imediatamente quando a utilização de HYLO DUAL INTENSE® foi interrompida.

Pode acontecer que verifique temporariamente visão turva após a aplicação de HYLO DUAL INTENSE® devido à viscosidade do colírio. Pela mesma razão, HYLO DUAL INTENSE® não deve ser aplicado enquanto usa lentes de contato.

Não existem dados clínicos controlados sobre a utilização de HYLO DUAL INTENSE® nas crianças ou durante a gravidez e amamentação. De acordo com o conhecimento atual, HYLO DUAL INTENSE® pode ser aplicado em crianças com idade superior a 6 anos, ou durante a gravidez e amamentação.

Com que frequência e durante quanto tempo pode utilizar HYLO DUAL INTENSE®?

HYLO DUAL INTENSE® deve ser utilizado de acordo com as instruções neste folheto ou recomendações dadas pelo seu médico. Geralmente aplica-se uma gota de HYLO DUAL INTENSE® três vezes ao dia no saco conjuntival de cada olho em adultos e crianças com mais de 6 anos. Se aplicar HYLO DUAL INTENSE® com mais frequência (por exemplo, mais de 10 vezes por dia) ou sentir agravamento dos seus sintomas, deve consultar regularmente o seu médico oftalmologista.

Durante a gravidez e amamentação, bem como em crianças com idade inferior a 12 anos, HYLO DUAL INTENSE® não deve ser aplicado mais do que 10 vezes por dia.

HYLO DUAL INTENSE® é recomendado no tratamento a longo termo. Contudo – como em qualquer situação de sintomas persistentes – deverá consultar o seu médico oftalmologista se as suas queixas/ sintomas não melhorarem, por exemplo, em duas semanas.


Quando não deve utilizar HYLO DUAL INTENSE®?

HYLO DUAL INTENSE® não deve ser utilizado se tiver hipersensibilidade a qualquer um dos componentes e também em crianças com menos de 6 anos de idade. HYLO DUAL INTENSE® não deve ser utilizado enquanto usa lentes de contato.

O que precisa de saber acerca de conservar HYLO DUAL INTENSE®?

Não conservar acima de 25 °C ( 25 °C).

HYLO DUAL INTENSE® pode ser utilizado durante 6 meses após a abertura.

Não utilize após a data de validade ().

Manter fora do alcance das crianças.

Estão disponíveis as seguintes apresentações:

10 ml de colírio

Data das informações:

Agosto de 2019

Fabricante ():

URSAPHARM Arzneimittel GmbH
Industriestraße 35
66129 Saarbrücken
Alemanha

Distribuidor:

URSAPHARM, UNIPESSOAL LDA.
Avenida D. João II, N.º 20, 1.º Andar, Parque das Nações
1990-095 Lisboa, Portugal
E-Mail: info@ursapharm.pt

Dispositivo médico  0197

STERILE A